

**ATINGE ȚINTA DE 3 MILIOANE
GĂSEȘTE. TRATEAZĂ. VINDECĂ
(TOȚI BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ).**

**ÎN FIECARE AN 9 MILIOANE DE PERSOANE
SE ÎMBOLNĂVESC DE TUBERCULOZĂ**

**3 MILIOANE DE PERSOANE NU
BENEFICIAZĂ DE ÎNGRIJIREA
NECESARĂ. AJUTAȚI-NE SĂ O OBȚINEM.**

ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

24 MARTIE 2015

Definiție:

Tuberculoza este o boală infecto-contagioasă cauzată de bacilul Koch (*Mycobacterium tuberculosis*) care poate afecta numeroase organe și țesuturi, dar în special plămâni.

Cum se transmite:

- Ⓢ Boala se transmite pe cale aeriană, de la un om bolnav, prin tuse, strănut, vorbit etc.
- Ⓢ Nu se transmite prin insecte, apă, veselă sau produse de sânge.

Simptomatologia:

- Ⓢ Tuse peste 3 săptămâni, cu expectorație sanguinolentă;
- Ⓢ Pierdere în greutate;
- Ⓢ Oboseală;
- Ⓢ Febră;
- Ⓢ Transpirații nocturne;
- Ⓢ Durere toracică;
- Ⓢ Dificultăți în respirație;
- Ⓢ Pierderea apetitului.

Prevenirea Tuberculozei:

- Ⓢ Trebuie respectate reguli generale de igienă personală (acoperirea gurii la tușit), a locuinței (camere curate, aerisite);
- Ⓢ Contactii trebuie să se controleze pentru a evita îmbolnăvirea;
- Ⓢ Copiii trebuie să efectueze chimioprofilaxie;
- Ⓢ Control radiologic periodic;
- Ⓢ Vaccinarea împotriva **Tuberculozei**

Tratamentul Tuberculozei:

- Ⓢ Necesită o strictă supraveghere, inițial în spital, apoi a medicului de familie;
- Ⓢ Constă în medicație zilnică timp de 2-3 luni, apoi de 3 ori pe săptămână, minim 6-8 luni;
- Ⓢ Se efectuează controlul bacteriologic al sputei după 3 luni, în luna a cincea și în ultima lună de tratament;
- Ⓢ După încheierea tratamentului se efectuează controale periodice până la 2 ani.
- Ⓢ ***TUBERCULOZA ESTE O BOALĂ VINDECABILĂ DACĂ TRATAMENTUL ESTE CORECT.***

☉ Conform *Raportului Global pentru Tuberculoză din 2014 al OMS*, în 2013, 9 milioane de persoane s-au îmbolnăvit de TBC și 1,5 milioane au decedat din cauza bolii. Tuberculoza reprezintă a 5-a cauză de deces pentru femeile de vârstă 15-44 ani. Dintre copii, 550.000 s-au îmbolnăvit de TBC și 80 de copii HIV-negativ au decedat din cauza bolii. Aproximativ 480.000 persoane au dezvoltat TBC multidrog-rezistente. În 2013, aproximativ 1,1 milioane de persoane HIV pozitive au prezentat TBC, iar 360.000 de persoane au decedat datorită TBC asociată cu HIV .

☉ Organizația Mondială a Sănătății și STOP TB Partnership 2006-2015, au lansat în 2006 strategia STOP TB, ținta propusă fiind “Reducerea dramatică a poverii globale a TBC până în 2015”, în acord cu Millenium Development Goals, stabilite de ONU.

Obiective:

- Realizarea accesului universal la îngrijire de înaltă calitate pentru toate persoanele cu TBC
- Reducerea suferinței umane și poverii socio-economice asociate cu TBC
- Protejarea populațiilor vulnerabile față de TBC, TBC/HIV și TBC multidrog-rezistentă
- Sprijinirea dezvoltării de noi instrumente și accesul la utilizarea lor în timp util și eficient
- Protejarea și promovarea drepturilor omului în prevenția, îngrijirea și controlul TBC.

Ținte:

☐ Stoparea și inversarea incidenței TBC până în 2015

☐ Ținte legate de multidrog-rezistență și aprobate de către Parteneriatul Stop TB:

❖ **Până în 2015:** reducerea prevalenței datorate TBC cu cel puțin 70% comparativ cu 1990 și tratarea cu succes a 85% din cazurile detectate.

❖ **Până în 2050:** Eliminarea TBC ca problemă de sănătate publică.